


TD 5

Traitement d'images de VtWeb (2)**1. Identification de la zone d'intérêt**

Monsieur Paul OUEDRAOGO, Conseiller Principal Afrique de la Convention Ramsar, a fourni la carte ci-dessous et désire que nous l'équipions en spatiocartes pour sa prochaine visite du site de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire.

**a. Géoréférencement de la carte**

Insérer au mieux l'image http://www-igm.univ-mlv.fr/~riazano/enseignement/Site_Ramsar_de_Grand_Bassam.jpg dans Google Earth.

b. Saisie du polygone

Délimiter la zone Ramsar par un polygone selon les limites figurant en noir sur la carte en sauvegardant ce polygone sur le disque. On appellera ce polygone « Site_Ramsar_de_Grand_Bassam_Contours.kml ».

2. Traitement de données Sentinel-2**a. Recherche de données**

Dans le panneau « Finder » de VtWeb (URL <http://visioterra.net/VtWeb/>), définir comme AOI le polygone à rechercher dans le fichier « Site_Ramsar_de_Grand_Bassam_Contours.kml ».

Quelles sont les dates des images déjà préparées sur la zone ?


.....

.....

b. Styles prédéfinis

Quelles sont les caractéristiques, apparences, objets mis en valeur des styles prédéfinis ?

- 4-3-2 - Natural colour - sta 2%
- 4-3-2 - Natural colour - eq
- 8-4-3 - Vegetation
- 12-11-4 - Urban
- 11-8-2 - Agriculture
- 12-11-8 - Atmospheric penetration
- 8-11-2 - Healthy vegetation
- 8-11-4 - Land/Water
- 12-8-3 - Natural with atmospheric removal
- 12-8-4 - Shortwave infrared
- 11-8-4 - Vegetation analysis

c. Style personnel

Inventer son propre style pour mettre en évidence les zones inondées.

3. Contrôle continua. Données Landsat

Quelles sont les dates d'acquisitions disponibles pour les données déjà préparées :

- Landsat-8
- Landsat-7 SLC-ON
- Landsat (4/5)

b. Meilleure composition colorée Sentinel-2

Choisir une « composition colorée de référence » pour les données Sentinel-2 :

c. Equivalences entre bandes

En vous inspirant de la figure à l'adresse <https://landsat.gsfc.nasa.gov/sentinel-2a-launches-our-compliments-our-complements/>, que sera la composition colorée à opérer pour les données Landsat afin d'être au plus près de la « composition colorée de référence » pour :

- Sentinel-2 (la référence)
- Landsat-8
- Landsat-7 SLC-ON
- Landsat (4/5)

d. Layer-stack

Construire un « layer-stack » de racine « Site_Ramsar_de_Grand_Bassam » puis avec des sous-dossiers « Sentinel-2 », « Landsat-8 », « Landsat-7 SLC-ON » et « Landsat-4/5 » dans lesquels seront rangées les scènes traitées selon la « composition colorée de référence ». Générer un hyperlook dont on fournira l'adresse.

e. Layer stack dans Google Earth contenant les images traitées dans VtWeb

Pour chaque image Sentinel ou Landsat, exporter un KML puis l'exécuter dans Google Earth. Construire un « layer stack » dans Google Earth avec des « folders » organisés comme dans le « layer stack » de VtWeb.

f. Lignes des eaux

Produire dans Google Earth les lignes de côte des eaux visibles (trait interrompu sous les nuages). Les lignes de côte d'une même scène auront une même couleur individualisée, distincte de celle des autres scènes.

Commenter les variations observées au cours du temps entre les lignes de côte.

g. Identification des changements au cours du temps

Pour chaque scène Sentinel ou Landsat examinée dans l'ordre chronologique, repérer par des polygones fermés les éléments (parcelles, déforestation, traces de feux, inondation, constructions, villages...) apparaissant dans la scène mais absents dans les scènes précédentes.